

Biotin H forte 10 mg Tabletten – Vitaminpräparat

BIOTIN H FORTE Originalpackung mit: 20 Tabletten (N1), 40 Tabletten und 120 Tabletten.

20 Tabletten: 00964471

40 Tabletten: 00573339

120 Tabletten: 00573345

Anwendungsgebiet

Vorbeugung und Behandlung von Biotin-Mangelzuständen.

- Behandlung von Biotin-Mangelzuständen beim sehr seltenen Biotin-abhängigen Carboxylasemangel.

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 10 mg Biotin.

Sonstige Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Povidon K=30 Crospovidon, Magnesiumstearat.

Dosierung Biotin H forte Tabletten

Täglich 5-10 mg Biotin.

Zur Behandlung des Carboxylasemangels:

- Täglich 1 Tablette (entsprechend 10 mg Biotin).

Art und Weise Biotin H forte Tabletten

Die Einnahme erfolgt mit ausreichend Flüssigkeit.

Gegenanzeigen

Gegen alle Arzneimittel können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, dann müssen Sie das Medikament sofort absetzen. Wenn schon eine Allergie gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels bekannt ist, darf es nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Es bestehen Hinweise, dass Arzneimittel, die epileptischen Krampfanfällen (Antikonvulsiva) entgegenwirken den Plasmaspiegel von Biotin senken.

Patientenhinweise

Die Dauer ist abhängig vom Verlauf der Grunderkrankung.

Nebenwirkungen

Sehr selten wurden allergische Reaktionen der Haut (Nesselsucht) beschrieben.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Schwangerschaft

Während Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Medikamente möglichst nur nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker einnehmen!

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung gibt es keine Einschränkungen.

Sonstiges

Zur Vorbeugung eines Biotin-Mangels sind weniger als 0,2 mg Biotin pro Tag ausreichend.

- Für niedrigere Mengen stehen Arzneimittel mit geringerem Gehalt an Biotin zur Verfügung.
- Mangelerscheinungen treten beim Menschen normalerweise nicht auf. Allerdings kann durch die Einnahme sehr großer Mengen von rohem Eiklar eine Hautentzündung aufgrund eines Biotin-Mangels (Mangeldermatitis), der sogenannte Eier-Eiweißschaden, ausgelöst werden.
- Eier-Eiweiß enthält das Glukoprotein Avidin, das mit Biotin einen stabilen Komplex eingeht, welcher im Magen-Darm-Kanal nicht aufgespalten werden kann. Auf diese Weise kann das Biotin dem Körper nicht zur Verfügung stehen und ein Biotinmangel entsteht.
- Darüber hinaus ist beim multiplen Carboxylasemangel der Biotinbedarf aufgrund eines genetischen Defektes erhöht.

Ein ausgeprägter Mangel zeigt sich an Haut und Anhangsgebilden der Haut und hat auch spezielle psychische Beschwerden und Störungen des Magen-Darm-Kanals zur Folge.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Pharmazeutischer Unternehmer: Canea Pharma GmbH, Hamburg