

tetesept:

Magen-Darm Tropfen

Flüssigkeit zum Einnehmen

Wirkstoffe:

10 ml Flüssigkeit enthalten:
Auszug aus Wermutkraut
(1:5,9) 2,9 ml;

Auszugsmittel:

Ethanol 50% (V/V);

Auszug aus Dillfrüchten
(1:5,9) 1,4 ml,

Auszugsmittel:

Ethanol 50% (V/V);

Auszug aus Benedikten-
kraut (1:5,9) 1,4 ml,

Auszugsmittel: Ethanol
50% (V/V);

Auszug aus Kümmel

(1:5,9) 1,4 ml,

Auszugsmittel:

Ethanol 50% (V/V);

Auszug aus Pfefferminz-
blättern (1:5,9) 2,9 ml,

Auszugsmittel:

Ethanol 50% (V/V)

Gebrauchsinformation:
Information
für den Anwender

Diese Packungsbeilage
beinhaltet:

1. Was sind tetesept Magen-Darm Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Magen-Darm Tropfen beachten?

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen tetesept Magen-Darm Tropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

3. Wie sind tetesept Magen-Darm Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind tetesept Magen-Darm Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind tetesept Magen-Darm Tropfen und wofür werden sie angewendet?

tetesept Magen-Darm Tropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Magen-Darm Tropfen beachten?

2.1 tetesept Magen-Darm Tropfen dürfen nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Benediktenkraut und andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile von tetesept Magen-Darm Tropfen sind;
- von Alkoholkranken.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von tetesept Magen-Darm Tropfen ist erforderlich:

Bei Gallensteinleiden und wegen des Alkoholgehaltes

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

sollten tetesept Magen-Darm Tropfen bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

2.3 Bei Einnahme von tetesept Magen-Darm Tropfen mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

2.4 Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

2.5 Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

tetesept Magen-Darm Tropfen dürfen wegen nicht ausreichender Untersuchungen und wegen des Alkoholgehaltes in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

2.6 Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von tetesept Magen-Darm Tropfen:

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (2,0 ml) bis zu 1 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

3. Wie sind tetesept Magen-Darm Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie tetesept Magen-Darm Tropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet 3 x täglich 2,0 ml (Markierung am Messbecher beachten) vor dem Essen in etwas Wasser einnehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von tetesept Magen-Darm Tropfen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge tetesept Magen-Darm Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen.

In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 50 ml werden etwa 24 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Magen-Darm Tropfen vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können tetesept Magen-Darm Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

- **Sehr häufig:** mehr als 1 von 10 Behandelten
- **Häufig:** weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
- **Gelegentlich:** weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
- **Selten:** weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
- **Sehr selten:** weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen sind möglich.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind tetesept Magen-Darm Tropfen aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Bei flüssigen Arzneimitteln mit pflanzlichen Extrakten sind Trübungen und geringe Schwankungen im Geschmack möglich, aber ohne Einfluss auf die Wirkung.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 1 Jahr.

6. Weitere Informationen

Was tetesept Magen-Darm Tropfen enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

10 ml Flüssigkeit enthalten: Auszug aus Wermutkraut (1:5,9) 2,9 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V)

Auszug aus Dillfrüchten (1:5,9) 1,4 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V)

Auszug aus Benediktenkraut (1:5,9) 1,4 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V)

Auszug aus Kümmel (1:5,9) 1,4 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V)

Auszug aus Pfefferminzblättern (1:5,9) 2,9 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V)

Sonstige Bestandteile: keine

Wie tetesept Magen-Darm Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:

Flüssigkeit zum Einnehmen Originalpackung mit 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer:



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
60318 Frankfurt
Telefon: 069/15 03-1
Telefax: 069/15 03-200

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt
Telefon: 069/15 03-1
Telefax: 069/15 03-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2014