



Gebrauchsanweisung



Wirkstoff: Magnesiumperoxid

Zusammensetzung:

100 g Pulver enthalten 100 g Magnesiumperoxid (Ph. Eur.).

Darreichungsform und Inhalt:

100 g Pulver zum Einnehmen nach Suspension in Wasser oder Saft.

Zweckbestimmung:

Spezifisches Mittel bei Stuhlverstopfung und Blähungen.

Hinweis:

Bei neu auftretenden Bauchbeschwerden und/oder länger anhaltenden Beschwerden sollten diese durch einen Arzt medizinisch abgeklärt werden.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei eingeschränkter Nierenfunktion, Darmperforation oder Darmverschluss (Ileus), starkem Durchfall und Herzrhythmusstörungen (AV-Block).

Nicht anwenden in der Schwangerschaft.

Nicht anwenden bei bekannter Hypersensitivität gegen Magnesiumperoxid.

Nur für Erwachsene. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen.

Verwendung in Schwangerschaft und Stillzeit:

Bisher sind keine Risiken im empfohlenen Dosisbereich bekannt geworden. Wir empfehlen aber aus prinzipiellen Erwägungen eine Anwendung in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der Aufnahme sollte generell ein Abstand von 1–2 Stunden zwischen der Einnahme von OZOVIT® MP und folgenden Arzneimitteln eingehalten werden:

Eisen, Tetracycline, Natriumfluorid, Isoniazid, Chlorpromazin und Digoxin. Wie bei anderen Laxantien kann es bei längerer Einnahme von OZOVIT® MP zu erhöhten Verlusten von Wasser, Kalium und anderen Salzen kommen. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen. Daher ist die Dauer der Anwendung auf eine Woche begrenzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

2-mal täglich 1 bis 3 Messlöffel Pulver in Wasser oder Saft einrühren und ca. 1 Stunde nach den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Auftreten stärkerer Durchfälle (wässrig-schleimig mit krampfartigen Schmerzen) Dosis verringern bzw. das Präparat einige Tage absetzen, so dann mit geringerer Dosis beginnen.

Die Dauer der Anwendung ist auf eine Woche begrenzt.

Nebenwirkungen:

Vereinzelte stärkere Durchfälle mit Darmkrämpfen und Elektrolytverlust beobachtet, die durch eine Reduzierung der Dosis behoben werden können. Sollten bisher unbekannte Nebenwirkungen auftreten, teilen Sie diese bitte ihrem Arzt oder Apotheker mit.





13242-DE-003

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:

Nicht über 25°C lagern.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Hinweis zur Verpackung:

In Abhängigkeit von Lagerzeit und -temperatur kann es zu einer geringen Freisetzung von Sauerstoff aus OZOVIT® MP kommen.

Um einen Druckausgleich zu ermöglichen, werden daher bei der Herstellung in die Schlauchverpackung zwei kleine Löcher gestanzt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Den Messlöffel außerhalb der Schlauchverpackung aufbewahren.

Messlöffel nicht in den Mund nehmen. Gegebenenfalls mit klarem Wasser reinigen und mit einem Tuch trocknen.

Ausgabe:

07.2010

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:				
Chargenbezeichnung	Verwendbar bis: Monat/Jahr	Gebrauchsanweisung beachten!	Obere Temperaturbegrenzung	Hersteller

Hersteller, Vertrieb und Information:

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen.

CE 0197

