

tetesept:

Husten Saft Bronchial-activ

10g/100ml Sirup

Wirkstoff:
Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt

Gebrauchsinformation:
Information für Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ beachten?
3. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist tetesept Husten Saft bronchial-activ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ und wofür wird er angewendet?

tetesept Husten Saft Bronchial-activ ist ein pflanzliches Mittel bei katarhalischen Erkrankungen der Atemwege.

Er wird angewendet bei Erkältungskrankheiten der Atemwege, entzündliche Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ beachten?

tetesept Husten Saft Bronchial-activ darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie allergisch gegen Spitzwegerich-Fluidextrakte, Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 217) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von tetesept Husten Saft Bronchial-activ sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie tetesept Husten Saft Bronchial-activ einnehmen. Bei länger dauernden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder

Zur Anwendung von tetesept Husten Saft Bronchial-activ bei Kindern liegen keine ausreichenden Informationen vor. Er soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor.

Schwangerschaft und Stillzeit:

tetesept Husten Saft Bronchial-activ sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen nicht in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

tetesept Husten Saft Bronchial-activ enthält 2,5 Vol.-% Alkohol.

tetesept Husten Saft Bronchial-activ enthält den Zucker Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie tetesept Husten Saft Bronchial-activ erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

10 ml (1 Messbecher) enthalten 6,79 g Saccharose (Zucker), entsprechend 0,57 BE. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

3. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen

Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Alter	Einzel-dosis	Tages-gesamt-dosis
Kleinkinder ab 1 Jahr bis unter 4 Jahren	5 ml 3-4 mal täglich	15 ml- 20 ml
Kinder ab 4 bis unter 12 Jahren	7,5 ml 3-4 mal täglich	22,5 ml- 30 ml
Heranwachsende ab 12 Jahren und Erwachsene	10 ml 3-4 mal täglich	30 ml- 40 ml

Dauer der Anwendung:

tetesept Husten Saft Bronchial-activ kann bis zum Abklingen der Beschwerden eingenommen werden. Beachten Sie jedoch die Angaben unter Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von tetesept Husten Saft bronchial-activ zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge tetesept Husten Saft Bronchial-activ eingenommen haben, als Sie sollten Vergiftungen mit Zubereitungen aus Spitzwegerich sind bisher nicht bekannt geworden. Möglicherweise treten bei der Einnahme zu großer Mengen von tetesept Husten Saft Bronchial-activ die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ abbrechen Eine Unterbrechung oder die vorzeitige Beendigung der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 217) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: <http://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist tetesept Husten Saft bronchial-activ aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach

„Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C lagern.

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein halbes Jahr.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was tetesept Husten Saft Bronchial-activ enthält

Der Wirkstoff ist:

100 g (entsprechend 79,37ml) Sirup enthalten:

Fluidextrakt aus

Spitzwegerichkraut 1:1 10 g

Auszugsmittel: Ethanol 24,6% (V/V)

Enthält 2,5 Vol.-% Alkohol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 217), Sucrose (Saccharose), gereinigtes Wasser.

Hinweis für Diabetiker:

10 ml enthalten 6,79 g Saccharose (entsprechend 0,57 BE),

5 ml enthalten 3,40 g Saccharose (entsprechend 0,29 BE).

Wie tetesept Husten Saft Bronchial-activ aussieht und Inhalt der Packung Originalpackung mit 150g Sirup

Pharmazeutischer Unternehmer:



Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2015.