

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### **REDUMAX**

Wirkstoff: Fucus vesiculosus (HAB 34) Ø

#### **Zusammensetzung**

10 ml (= 9,395 g) Mischung zum Einnehmen enthalten:

arzneilich wirksamer Bestandteil:

Fucus vesiculosus (HAB 34) Ø 0,0208 g  
(HAB 1, Vorschrift 4a)

#### Sonstiger Bestandteil:

Ethanol 43 % HAB 1

#### **Darreichungsform und Inhalt**

Mischung zum Einnehmen 50 ml  
(10 ml = 9,395 g Mischung)

Homöopathisches Arzneimittel bei Fettleibigkeit

Pharmazeutischer Unternehmer:

KREPHA GmbH

Schönauer Straße 32

69239 Neckarsteinach

Telefon: 0 62 29/78 75 · Fax: 0 62 29/72 53

Hersteller:

Lichtenheldt GmbH

Industriestraße 7-9

23812 Wahlstedt

#### **Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.

Dazu gehört: Übergewicht.

Hinweis: Das Arzneimittel ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Maßnahmen zur Behandlung des Übergewichts (wie z.B. eine Ernährungsumstellung).

#### **Gegenanzeigen**

*Wann dürfen Sie Redumax nicht einnehmen?*

Bei Vorliegen einer Jodüberempfindlichkeit darf Redumax nicht eingenommen werden.

Redumax ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

*Wann dürfen Sie Redumax erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Bei Schilddrüsenerkrankungen ist Redumax nicht ohne Ärztlichen Rat anzuwenden.

Hinweis: Wegen des Alkoholgehaltes soll Redumax bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Redumax nicht eingenommen werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb – auch wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Redumax enthält 50 Vol.% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht unter anderem bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Hinweis unter „Gegenanzeigen“ beachten.

## **Wechselwirkungen**

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Redumax?*

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

### Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch all-gemeinschaftliche Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

## **Dosierungsanleitung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Redumax nicht anders verordnet hat. Bitte hal-ten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Redumax sonst nicht richtig wirken kann!

*Wie viel und wie oft sollten Sie Redumax anwenden?*

Nehmen Sie 1–3mal täglich 5–10 Tropfen ein.

## **Art und Dauer der Anwendung**

*Wie und wann sollten Sie Redumax anwenden?*

Redumax wird am besten zusammen mit etwas Wasser eingenommen oder direkt auf die Zunge ge-tropft. Die Tropfen sind jeweils 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten zu nehmen und vor dem Hinunter-schlucken eine Weile im Mund zu behalten.

Vor jeder Einnahme gut schütteln.

*Wie lange sollten Sie Redumax anwenden?*

Auch homöopathische Medikamente wie Redumax sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### *Anwendungsfehler und Überdosierung*

*Was ist zu tun, wenn Redumax in zu großen Mengen angewendet wurde?*

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt auf-zusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden etwa 20 g Alkohol aufgenommen.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Redumax angewendet oder eine Anwendung ver-gessen haben?*

In diesen Fällen setzen Sie die Einnahme von Redumax wieder, wie unter „Dosierungsanleitung“ beschrieben, fort.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?*

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

## **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Redumax auftreten?*

Eine bestehende Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Be-schwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel sowie auf dem Etikett unter der Angabe „Apothekenpflichtig“ aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Geben Sie nach Gebrauch die Flasche wieder gut verschlossen in dem dafür vorgesehenen Um-karton zurück!

**Stand der Information:** November 1999

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!