

Dulcolax® M Balance flüssig



5 g Macrogol 4000 in 10 ml Wasser
Lösung zum Einnehmen

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung von Dulcolax® M Balance flüssig beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist DULCOLAX® M Balance flüssig und wofür wird es angewendet?

DULCOLAX® M Balance flüssig ist ein osmotisch wirksames Abführmittel.

DULCOLAX® M Balance flüssig ist ein in Wasser gelöstes Macrogol zur Anwendung bei akuter und chronischer Verstopfung bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren. Die Anwendung bei Kindern bis 8 Jahre sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen. Bei Behandlung einer chronischen Verstopfung mit DULCOLAX® M Balance flüssig sollte die Verstopfungsursache ärztlich abgeklärt sein. DULCOLAX® M Balance flüssig ist für die tägliche Anwendung geeignet.

Zusammensetzung:

10 ml Lösung zum Einnehmen enthalten:
5 g Macrogol 4000 in gelöster Form.

Sonstige Bestandteile: Macrogol 400, Citronensäure, Kaliumsorbat (Konservierungsmittel) und gereinigtes Wasser.

Die Lösung ist frei von Aromastoffen, Zucker, Alkohol, Kochsalz sowie anderen Salzen*.

* frei von Kaliumchlorid, Natriumhydrogencarbonat

DULCOLAX® M Balance flüssig ist eine transparente Lösung.

Durch das hohe Wasserbindungsvermögen von Macrogol 4000 – vergleichbar mit einem flüssigen Schwamm – kann viel Flüssigkeit in den Darm transportiert und so der verhärtete Stuhl aufgeweicht werden. DULCOLAX® M Balance flüssig erhöht den Flüssigkeitsgehalt des Stuhls und regt durch das vergrößerte Stuhlvolumen die natürliche Darmbewegung an. Der Wirkstoff Macrogol 4000 wird weder im Blutkreislauf aufgenommen, noch erfolgt eine Verstoffwechslung im Magen-Darm-Trakt. Der Wirkstoff wird unverändert ausgeschieden.

DULCOLAX® M Balance flüssig enthält keine Zucker und ist daher für Diabetiker oder für Patienten, die eine Galaktosefreie Diät einhalten müssen, geeignet.

DULCOLAX® M Balance flüssig enthält kein Kochsalz sowie keine anderen Salze*.

* frei von Kaliumchlorid, Natriumhydrogencarbonat

Wie ist DULCOLAX® M Balance flüssig einzunehmen?

Nehmen Sie DULCOLAX® M Balance flüssig immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsanleitung ein. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

20 bis 40 ml Lösung (entspricht 10 bis 20 g Macrogol 4000) täglich, vorzugsweise als eine Dosis morgens.

Kinder von 4 bis 7 Jahren:

Die Anwendung bei Kindern bis 8 Jahre sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 16 bis 32 ml Lösung (entspricht 8 bis 16 g Macrogol 4000) täglich, vorzugsweise als eine Dosis morgens.

Kinder von 2 bis 3 Jahren:

Die Anwendung bei Kindern bis 8 Jahre sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 8 bis 16 ml Lösung (entspricht 4 bis 8 g Macrogol 4000) täglich, vorzugsweise als eine Dosis morgens.

Die Dosis von DULCOLAX® M Balance flüssig wird mit dem beigegeführten Dosierbecher abgemessen und kann je nach erzielter Wirkung angepasst werden. Die empfohlenen Dosierungen können nach dem persönlichen Bedarf täglich oder alle 2 Tage eingenommen werden.

DULCOLAX® M Balance flüssig kann unverdünnt eingenommen werden. Nach der Einnahme sollten Sie ein Glas Wasser oder sonstige Flüssigkeit (Fruchtsäfte, Tee etc.) trinken (ca. 150 ml). Alternativ können Sie DULCOLAX® M Balance flüssig auch dem Getränk Ihrer Wahl beimischen und so Ihre persönliche Geschmacksrichtung schaffen.

Bitte beachten Sie:

Der verdauungsregulierende Effekt von DULCOLAX® M Balance flüssig tritt gewöhnlich 24 bis 48 Stunden nach der Einnahme ein.

Kinder sollten DULCOLAX® M Balance flüssig nicht länger als 3 Monate einnehmen.

DULCOLAX® M Balance flüssig darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Macrogol (Polyethylenglykol) oder einen der sonstigen Bestandteile von DULCOLAX® M Balance flüssig sind

wenn Sie eine bestehende Erkrankung haben, wie z. B.:

- eine schwere Darmerkrankung
- eine entzündliche Darmerkrankung (wie Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn)
- einen Darmdurchbruch oder wenn die Gefahr eines Darmdurchbruchs besteht
- einen Darmverschluss oder wenn der Verdacht auf Darmverengungen besteht
- wenn Sie Schmerzen im Bauchraum unbestimmten Ursprungs haben.

Nehmen Sie dieses Produkt nicht ein, wenn eine der oben aufgeführten Krankheiten bei Ihnen vorliegt. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie zuerst Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie DULCOLAX® M Balance flüssig einnehmen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von DULCOLAX® M Balance flüssig ist erforderlich

Nach der Einnahme von Macrogol- (Polyethylenglykol-) haltigen Präparaten wurden sehr seltene Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag und Gesichtsschwellung (Ödem) bei Erwachsenen beschrieben. Vereinzelt wurde von allergischen Reaktionen berichtet, die zu Ohnmacht oder Kreislaufkollaps und allgemeinem Unwohlsein führten.

Wenn Sie eines dieser Anzeichen bei sich bemerken, sollten Sie DULCOLAX® M Balance flüssig nicht mehr einnehmen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Da unter der Therapie mit DULCOLAX® M Balance flüssig Durchfälle auftreten können, sollten Sie vor der Einnahme Ihren Arzt oder Apotheker fragen, wenn Ihre Leber- oder Nierenfunktion beeinträchtigt ist, Sie Diuretika (Wasser-Tabletten) einnehmen, Sie älter sind und ein erhöhtes Risiko für niedrige Natrium- oder Kalium-Spiegel im Blut haben.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da Macrogol 4000 kaum resorbiert wird, sind keine Auswirkungen auf eine Schwangerschaft oder auf den Säugling während der Stillzeit zu erwarten. DULCOLAX® M Balance flüssig kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden, die Einnahme sollte jedoch unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung einiger Arzneimittel wie z. B. Antiepileptika kann durch gleichzeitige Einnahme mit Dulcolax M Balance flüssig herabgesetzt werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, oder wenn andere Arzneimittel bei Ihrem Kind angewendet wurden/ werden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wenn Sie eine größere Menge DULCOLAX® M Balance flüssig eingenommen haben, als Sie sollten

Sie müssen mit Durchfällen rechnen, die nach Unterbrechen der Behandlung oder Verringerung der Dosis zum Stillstand kommen.

Hoher Flüssigkeitsverlust durch Durchfälle oder Erbrechen kann eine Korrektur des Elektrolythaushalts erfordern, weswegen Sie einen Arzt kontaktieren sollten.

Wenn Sie die Einnahme von DULCOLAX® M Balance flüssig vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

DULCOLAX® M Balance flüssig kann Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen waren im Allgemeinen schwach und vorübergehend:

Erwachsene:

Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann es häufig zu Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Drang zur Stuhlentleerung und Stuhlinkontinenz kommen.

Sehr selten kann es zu Symptomen einer allergischen Reaktion wie Hautausschlag, Nesselsucht, Wasseransammlung im Gewebe, Gesichtsschwellung (im Rahmen eines Quincke Ödems) mit Schwellung der Lippen und/oder der Wangen, anaphylaktischer Schock kommen.

Mit unbekannter Häufigkeit (Daten wurden erst nach dem Inverkehrbringen erhoben) kann es zu erniedrigtem Natrium- und Kaliumgehalt im Blut sowie möglichem Flüssigkeitsmangel verursacht durch starken Durchfall, insbesondere bei älteren Patienten, kommen.

Kinder:

Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch können häufig Bauchschmerzen, Durchfall, der Wundsein um den After verursachen kann, Übelkeit, Erbrechen und Blähungen auftreten.

Mit unbekannter Häufigkeit kann es zu allergischen (Überempfindlichkeits-) Reaktionen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanleitung angegeben sind.

Wie ist DULCOLAX® M Balance flüssig aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Bitte verwenden Sie DULCOLAX® M Balance flüssig nicht mehr nach dem auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Bitte lagern Sie DULCOLAX® M Balance flüssig nicht über 25 °C und nicht im Kühlschrank.

Nach dem Öffnen der Flasche ist DULCOLAX® M Balance flüssig noch 6 Wochen haltbar.

Wie DULCOLAX® M Balance flüssig aussieht und Inhalt der Packung

DULCOLAX® M Balance flüssig ist eine transparente Lösung.

Die Lösung zum Einnehmen ist in Packungen mit 100 ml und 250 ml erhältlich.

Hersteller:

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH
Ruhlandstr. 5, 83646 Bad Tölz

Hersteller des Dosierbechers:

Bormioli Rocco e Figlio S.p.A., Str. Nazionale Emilie, 58,
43010 Castelguelfo, Italien (CE0373)

Vertrieb:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Vertriebslinie Thomae
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein
Telefon: 0 800/77 90 900, Telefax: 0 61 32/72 99 99
www.dulcolax.de

Apothekenexklusives Medizinprodukt

25°C

Stand der Information: April 2012.

Liebe Patientin, lieber Patient,
Dulcolax® M Balance flüssig ist ein Abführmittel zur Anwendung bei akuter und chronischer Verstopfung. Durch sein hohes Wasserbindungsvermögen transportiert der Wirkstoff Macrogol 4000 viel Flüssigkeit in den Darm und weicht so den verhärteten Stuhl auf. Der Wirkstoff erhöht den Flüssigkeitsgehalt des Stuhls, regt durch das vergrößerte Stuhlvolumen die natürliche Darmbewegung an und löst die Stuhlentleerung aus. Dulcolax® M Balance flüssig **enthält kein Kochsalz sowie keine anderen Salze***.

* frei von Kaliumchlorid, Natriumhydrogencarbonat

Durch die flüssige Darreichungsform kann Dulcolax® M Balance flüssig mit dem beiliegenden Dosierbecher einfach **nach Ihrem persönlichen Bedarf dosiert werden.**

Dosierungsempfehlungen:

Erwachsene und
Kinder ab 8 Jahren: 20 bis 40 ml Lösung täglich
Kinder von 4 bis 7 Jahren: 16 bis 32 ml Lösung täglich
Kinder von 2 bis 3 Jahren: 8 bis 16 ml Lösung täglich

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lösung **aromafrei** ist und unverdünnt eingenommen werden kann. Nach der Einnahme sollten Sie ein Glas Wasser oder sonstige Flüssigkeit (Fruchtsäfte, Tee etc.) trinken (etwa 150 ml). Alternativ können Sie Dulcolax® M Balance flüssig auch einem Getränk Ihrer Wahl beimischen und so Ihre ganz persönliche Geschmacksrichtung schaffen.

Wenn Sie an weiteren Informationen zum Thema Verstopfung und Dulcolax® M Balance flüssig interessiert sind, senden wir Ihnen gerne unseren aktuellen Verdauungsratgeber zu. Bitte senden Sie den ausgefüllten Antwort-Coupon zurück und nennen Sie uns Ihre Adresse. Sie können den Ratgeber auch unter www.dulcolax.de im Internet downloaden.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung
Ihr Dulcolax®-Team

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Abteilung Marketing CHC Deutschland, Marketing Dulcolax,
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein

Bitte senden Sie mir den aktuellen Dulcolax®-Verdauungsratgeber zum Thema Verstopfung zu:

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ, Ort _____