

diarrhoesan® elektrolyt

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) • Mit Zucker und Süßungsmittel • Verbraucherinformation

Bitte lesen Sie diese Information aufmerksam durch, da sie wichtige Angaben darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Lebensmittels für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zu beachten ist. Wenden Sie sich bei Fragen an die Firma Dr. Loges + Co. GmbH, Postfach 1262, 21412 Winsen (Luhe), Tel. 04171 707-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@loges.de. Vertrieb in Österreich: Dr. Loges Österreich GmbH, Mayrwiesstraße 25, 5300 Hallwang bei Salzburg, www.loges.at.

Zum Diätmanagement bei Durchfallerkrankungen mit erhöhtem Bedarf an Flüssigkeit und Elektrolyten

Nährwertdeklaration	Pro 100 g	Pro 100 ml	Pro Portion	
			1 Beutel	2 Beutel
Energie	1.417 kJ/ 333 kcal	45 kJ/ 11 kcal	89 kJ/ 21 kcal	178 kJ/ 42 kcal
Fett	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,1 g	0 g	0 g	0 g
Kohlenhydrate	76 g	2,4 g	4,8 g	9,6 g
davon Zucker	62 g	2,0 g	3,9 g	7,8 g
Glukose (Dextrose)	60 g	1,9 g	3,8 g	7,6 g
Eiweiß	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
Salz	11 g	0,35 g	0,69 g	1,4 g
Natrium	4.384 mg	138 mg	276 mg	552 mg
Kalium	2.481 mg	78 mg	156 mg	312 mg
Chlorid	4.508 mg	142 mg	284 mg	568 mg

Konzentration der fertigen Lösung

Natrium	60 mmol/l
Kalium	20 mmol/l
Chlorid	40 mmol/l
Citrat	16 mmol/l
Glukose (Dextrose)	105 mmol/l
Osmolarität nach Zubereitung:	ca. 241 mmol/l

Zutaten

Dextrose-Anhydrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Heidelbeer-Fruchtpulver, Heidelbeer-Extrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose



vegan



lactosefrei



glutenfrei

Pro Portionsbeutel = 6,3 g Pulvermischung

diarrhoesan® elektrolyt

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

diarrhoesan® elektrolyt ist in seiner speziellen Formulierung mit Mineralien und Glukose so zusammengesetzt, dass ein mit Durchfallerkrankungen einhergehender erhöhter Bedarf an Elektrolyten und Flüssigkeit gezielt gedeckt werden kann.

Das Mengenverhältnis der Bestandteile ist genau auf die gestörte Resorption der Patienten abgestimmt und entspricht, wie auch die Osmolarität der zubereiteten verzehrfertigen Lösung, den Empfehlungen pädiatrischer Leitlinien.

Anwendungshinweis

Der Inhalt eines Beutels wird – unmittelbar vor Verwendung – in 200 ml Trinkwasser gelöst und direkt getrunken. Achten Sie bei der Zubereitung bitte genau auf das angegebene Mischungsverhältnis.

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach dem individuellen Bedarf, in der Regel mehrmals täglich bzw. nach jedem flüssigen Stuhlgang:

- Kleinkinder (1 bis 3 Jahre): 3 bis 5 Beutel in 24 Stunden
- Kinder ab 4 Jahre: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, maximal 8 Beutel in 24 Stunden
- Jugendliche und Erwachsene: 1 bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie beträgt bei Kleinkindern in der Regel 6–12 Stunden und sollte 24 Stunden nicht überschreiten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Bis zum Abklingen des Durchfalls, höchstens 36 Stunden. Sollte der Durchfall länger andauern, ist nochmals der Arzt aufzusuchen.

Wichtige Hinweise

Bei diarrhoesan® elektrolyt handelt es sich um eine bilanzierte Diät. Dieses Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ist nicht als

einzigste Nahrungsquelle geeignet und darf nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Geeignet für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Tritt nach 36 Stunden keine Besserung ein, sollte unbedingt erneut ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz) und erhöhtem Blutdruck ist wegen der zugeführten Flüssigkeits- und Natriummengen ein Arzt zu befragen. Aufgrund des Glukose-Gehaltes sollten Diabetiker diarrhoesan® elektrolyt nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen.

diarrhoesan® elektrolyt darf nicht bei eingeschränkter Nierenfunktion, unstillbarem Erbrechen, Bewusstseinstörung bzw. Schock bei schweren Flüssigkeitsmangelzuständen, metabolischer Alkalose, Monosaccharid-Malabsorption und Verschlusskrankheiten im Verdauungstrakt verwendet werden.

Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet.

Bitte bewahren Sie diarrhoesan® elektrolyt an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Packungsgrößen

diarrhoesan® elektrolyt ist in einer Packung mit 10 Portionsbeuteln in der Apotheke erhältlich.



Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!

Ihre Dr. Loges + Co. GmbH

Dr. Loges 
Naturheilkunde neu entdecken