

# NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver

800 g Pulver: PZN 3378555

## Eigenschaften

- Anfangsmilch
- Von Geburt an bis zum 6. Monat
- Hochwertige Zusammensetzung
- Enthält die mehrfach ungesättigte Fettsäure DHA\*
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort

\*gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben

## Zusammensetzung und Zutaten

NAHRWERTE		im	100g	100ml
	Durchschnitt	100g	Pulver	trinkfertige
				Nahrung
<b>Energie</b>			2123	276
			507	66
<b>Fett</b>			25	3,3
davon				
- gesättigte Fettsäuren			11,6	1,5
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren			5,1	0,7
davon				
- Linolsäure			4,5	0,6
- α-Linolensäure			405	53
- Docosahexaensäure (DHA)			120	16
- Arachidonsäure (ARA)			30	4
<b>Kohlenhydrate</b>			59,7	7,8
davon				
- Zucker			41,7	5,4
davon				
- Lactose			41,7	5,4
<b>Eiweiß</b>			10,4	1,4
<b>Vitamine</b>				
Vitamin A			440	57
Vitamin D			11,2	1,5
Thiamin			0,8	0,10
Riboflavin			1,3	0,2
Niacin			4,5	0,6
Pantothensäure			5	0,7
Vitamin B6			0,5	0,07
Biotin			18	2,3
Folat			140	18
Vitamin B12			1,7	0,2
Vitamin C			60	7,8
Vitamin K			60	7,8
Vitamin E			8,7	1,1
<b>Mineralstoffe</b>				
Natrium			175	23
Kalium			525	68
Chlorid			370	48
Calcium			470	61
Phosphor			265	34
Magnesium			45	5,9
Eisen			4	0,5
Zink			3,3	0,4
Kupfer			0,39	0,05
Jod			90	12
Selen			27	3,5
Mangan			0,045	0,006
Fluorid			<0,45	<0,06
<b>Weitere Inhaltsstoffe</b>				
Cholin			170	22
Inositol			80	10,4
Taurin			40	5,2
L-Carnitin			20	2,6

**Zutaten: Magermilch, Milchproteine**, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Soja und Kokosnussöl), Calciumsalze der Zitronensäure, **Fischöl** (mit **Milch**), Emulgator (**Sojalecithin**), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, Natriumchlorid, Öl aus *Mortierella alpina* (mit **Milch**), Inositol, L-Tryptophan, Taurin, Magnesiumoxid, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat.

## Anwendung

Novalac 1 ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Neugeborenen und Säuglingen von Geburt an, als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zur Muttermilch.

Novalac 1 enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben) und ist in der Zusammensetzung für Säuglinge von Geburt an abgestimmt.

Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6
Anzahl Fläschchen pro Tag	6	5	5	4
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.  
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac 1**

Zubereitung:

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

1. Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
2. Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
3. Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
4. Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

## SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

## Wichtige Hinweise

Stillen ist das Beste für Ihr Baby, denn Muttermilch versorgt das Baby mit allen wichtigen Nährstoffen in genau abgestimmter Menge. Muttermilch ist ein guter Schutz gegen Krankheiten und die preiswerteste Ernährungsform.

Je früher und häufiger Sie Ihr Kind anlegen, desto eher kommt der Milchfluss in Gang. Das Stillen wird durch eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft und nach der Entbindung begünstigt, während die Gabe von Säuglingsnahrung den Stillserfolg beeinträchtigen kann. Da die Entscheidung nicht zu Stillen nur schwer rückgängig zu machen ist sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten. Beachten Sie die Hinweise und Zubereitungsanleitungen auf der Packung genau, denn eine unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

## Kontakt

### **Vived GmbH**

Horbeller Straße 11

50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240

Fax: 0049-(0)2234-2036-44