

NOVALAC 2 Folgemilch Pulver

800 g Pulver: PZN 3378561

Eigenschaften

- Folgemilch nach dem 6. Monat
- Ohne Stärke
- Ohne Zusatz von Aromastoffen wie z.B. Vanillin
- **DHA** trägt zur gesunden Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zu 12 Monaten bei
- **Vitamin D** trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei Kindern bei
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort

Zusammensetzung und Zutaten

NÄHRWERTE			
	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie			
	kJ	2108	274
	kcal	503	65
Fett	g	25	3,3
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	11,6	1,5
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,2	0,7
davon			
- Linolsäure	g	4,6	0,6
- α-Linolensäure	mg	410	53
- Docosahexaensäure (DHA)	mg	120	16
Kohlenhydrate	g	59,9	7,8
davon			
- Zucker	g	41	5,3
davon			
- Lactose	g	41	5,3
Eiweiß	g	9,4	1,2
Vitamine			
Vitamin A	µg	440	57
Vitamin D	µg	12	1,6
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Niacin	mg	5	0,7
Pantothensäure	mg	5	0,7
Vitamin B ₆	mg	0,5	0,07
Biotin	µg	18	2,3
Folat	µg-DFE	170	22
Vitamin B ₁₂	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	60	7,8
Vitamin K	µg	60	7,8
Vitamin E	mg	8	1
Mineralstoffe			
Natrium	mg	165	21
Kalium	mg	600	78
Chlorid	mg	425	55
Calcium	mg	650	85
Phosphor	mg	370	48
Magnesium	mg	45	5,9
Eisen	mg	7,8	1
Zink	mg	3,3	0,4
Kupfer	mg	0,39	0,05
Jod	µg	97	13
Selen	µg	25	3,3
Mangan	mg	0,045	0,006
Fluorid	mg	<0,45	<0,06

Zutaten: Magermilch, Maltodextrin, Lactose (aus **Milch**), pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Calciumsalze der Zitronensäure, **Fischöl** (mit **Milch**), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Emulgator (**Sojalecithin**), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, L-Tryptophan, L-Cystin, L-Isoleucin, Natriumchlorid, L-Phenylalanin, Eisensulfat, Magnesiumoxid, L-Leucin, L-Threonin, L-Tyrosin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat.

Anwendung

Novalac 2 ist eine Folgemilch von besonders ausgesuchter Qualität, die speziell auf die Bedürfnisse von Säuglingen nach dem 6. Monat abgestimmt ist. Novalac 2 Folgemilch im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an Novalac 1/Novalac PRE.

DOSIERUNG	
Dosierung	
Alter (monate)	>6
Anzahl Flaschen pro Tag	3*
Anzahl Messlöffel	7
Abgekochtes Wasser (ml)	210

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Standardauflösung:
13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser
= 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac 2**

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Trinkmengen und Anzahl aller Mahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Flaschen pro Tag sind empfohlene Richtwerte.

Zubereitung:

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

1. Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

2. Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
3. Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
4. Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Wichtige Hinweise

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Novalac 2 Folgemilch ist Teil einer Mischkost und dient nicht als Ersatz für die Muttermilch während der ersten sechs Lebensmonate. Die Entscheidung mit der Verwendung von Beikost zu beginnen, einschließlich eines ausnahmsweisen Beginns breits in den ersten sechs Monaten sollte nur auf Anraten Ihres Kinderarztes oder Hebamme, unter der Berücksichtigung der Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse des einzelnen Säuglings getroffen werden.

Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt, niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

Nach dem 6. Lebensmonat sollten Sie die Ernährung Ihres Babys nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt schrittweise erweitern und ausbauen.

Kontakt

Vived GmbH

Horbeller Straße 11

50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240

Fax: 0049-(0)2234-2036-44