

NOVALAC HA SÄUGLINGSMILCHNAHRUNG

800 g Pulver: PZN 04572756

Anwendung

Novalac HA ist eine andickende hypoallergene Säuglingsmilchnahrung mit aufgespaltenem (hydrolysiertem) Milcheiweiß und eignet sich für die besondere Ernährung von allergiegefährdeten Säuglingen von der Geburt an, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

- Optimal für allergiegefährdete Babys
- Aufgespaltenes (hydrolysiertes) Protein
- Von Geburt an bis zum 12. Monat
- Andickende Zusammensetzung
- Reduzierter Lactosegehalt
- Alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort
- Inhalt: 800g

Nährwerte & Zutaten

Maltodextrin, Lactose (Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Sonnenblumen- und Kokosöl), Maisstärke, hydrolysiertes Molkeprotein*, Tricalciumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumchlorid, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothersäure), Dinatriumphosphat, Natriumchlorid, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Taurin, Inositol, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherolreicher Extrakt), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat.

* Die Proteinquelle in Novalac HA ist Kuhmilch.

im Durchschnitt		100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
Energie	kcal	505,5	65,7	100
	kJ	2116,5	275,1	418,7
Fett davon	g	25,5	3,3	5
- gesättigte Fettsäuren	g	9,9	1,3	2
- einf. unges. Fetts.	g	9,2	1,2	1,8
- mehrf. unges. Fetts.	g	5,1	0,7	1
Kohlenhydrate davon	g	57	7,4	11,3
- Zucker	g	25	3,3	4,9
Eiweiß	g	12	1,6	2,4
Salz	g	0,425	0,06	0,08
Vitamine				
A	µg RE	450	58,5	89
B1	µg	400	52	79,1
B2	µg	800	104	158,3
B6	µg	300	39	59,3
B12	µg	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	11,9
D3	µg	7,5	1	1,5
E	mg α-TE	11	1,4	2,2
K1	µg	30	3,9	5,9
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg	2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg	60	7,8	11,9
Biotin	µg	15	2	3
Mineralstoffe				
Natrium	mg	170	22,1	33,6
Kalium	mg	500	65	98,9
Chlorid	mg	400	52	79,1
Calcium	mg	400	52	79,1
Phosphor	mg	250	32,5	49,5
Magnesium	mg	45	5,9	8,9
Eisen	mg	6	0,8	1,2
Zink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	65	8,5	12,9
Kupfer	µg	350	45,5	69,2
Mangan	µg	50	6,5	9,9
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<350	<46	<70
Chrom	µg	23	3	4,5
Molybdän	µg	23	3	4,5
Cholin	mg	80	10,4	15,8
Inositol	mg	25	3,3	4,9
Taurin	mg	40	5,2	7,9
L-Carnitin	mg	10	1,3	2

Dosierung

Alter (Monate)	0–1	1–2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6–7	5
Anzahl Messlöffel	3–4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90–120	120

2–3	3–4	4–5	5–6	>6
6	6,5	7	7,5	>7,5
5	5	4	4	3*
4–5	6	6–7	6–7	7
120–150	180	180–210	180–210	210

*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac **HA**.

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

Zubereitung

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

1 – Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlen säurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

2 – Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.

3 – Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

4 – Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

Aufgrund der besonderen Zusammensetzung besitzt Novalac HA im Vergleich zu Standardmilchnahrungen einen speziellen Geschmack und Geruch. Möglicherweise müssen Sie Novalac HA mehr schütteln, um das Pulver aufzulösen. Für eine bessere Anwendung ist

es möglich, einen Sauger mit regulierbarem Nahrungsfluss zu verwenden. Ohne die Gesundheit Ihres Babys zu beeinträchtigen, kann es zu weniger festen und/oder grünlichen Stuhlgängen kommen.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Weitere Hinweise

Beachten Sie die Hinweise und Zubereitungsanleitungen auf der Packung genau, denn eine unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

Kontakt

Vived GmbH

Horbeller Straße 11
50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240

Fax: 0049-(0)2234-2036-44

Email: dieter.marx@vived.de