

Novalac V Säuglings-Spezialnahrung

800 g Pulver: PZN 06488474

Anwendung

Novalac V ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit Verstopfung, verlangsamter Darmpassage sowie hartem Stuhl abgestimmt ist, wenn nicht oder teilweise gestillt wird. Novalac V hat eine abgestimmte Mineralstoff- und Kohlenhydratzusammensetzung (nur Lactose) um die Darmpassage zu regulieren.

- Zum Diätmanagement bei Verstopfung und hartem Stuhlgang
- Von Geburt an bis zu 36. Monaten
- Hoher Milchzuckergehalt und Magnesium sorgen für einen weichen Stuhlgang
- Alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort
- Inhalt: 800g

Nährwerte & Zutaten

Magermilch, Milchproteine, pflanzliche Öle (Palm-, Soja und Kokosnussöl), **Lactose** (aus **Milch**), Calciumsalze der Zitronensäure, **Fischöl** (mit **Milch**), Kaliumcitrat, Emulgator (**Sojalecithin**), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Cholinbitartrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, L-Tyrosin, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothenensäure, L-Phenylalanin, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Inositol, Öl aus *Mortierella alpina* (mit **Milch**), Taurin, L-Tryptophan, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Natriumselenit, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat.

NÄHRWERTE	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie	kJ	2121	276
	kcal	506	66
Fett	g	25	3,3
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	11,7	1,5
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,1	0,7
Kohlenhydrate	g	59,4	7,7
davon			
- Zucker	g	59,4	7,7
davon			
- Lactose	g	59,4	7,7
Eiweiß	g	10,4	1,4
Salz	g	0,438	0,06
Vitamine			
Vitamin A	µg	440	57
Vitamin D	µg	12	1,6
Vitamin K	µg	60	7,8
Vitamin C	mg	60	7,8
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,3	0,2
Vitamin B6	mg	0,5	0,07
Niacin	mg	4,5	0,6
Folat	µg-DFE	140	18
Vitamin B12	µg	1,8	0,2
Pantothensäure	mg	5	0,7
Biotin	µg	18	2,3
Vitamin E	mg	8,7	1,1
Mineralstoffe			
Natrium	mg	175	23
Chlorid	mg	390	51
Kalium	mg	540	70
Calcium	mg	515	67
Phosphor	mg	270	35
Magnesium	mg	65	8,5
Eisen	mg	5,1	0,7
Zink	mg	3,5	0,5
Kupfer	mg	0,39	0,05
Jod	µg	95	12
Selen	µg	26	3,4
Mangan	mg	0,045	0,006
Chrom	µg	<45	<5,9
Molybdän	µg	<45	<5,9
Fluorid	mg	<0,45	<0,06
Weitere Inhaltsstoffe			
Cholin	mg	170	22
Inositol	mg	80	10,4
Taurin	mg	40	5,2
L-Carnitin	mg	20	2,6

Dosierung

Alter (Monate)	0–1	1–2	2–4	4–6	6–12	12–36
Anzahl Fläschchen pro Tag	6	5	5	4	3*	2*–3*
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7	7	8
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210	210	240

Zubereitung

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

1 – Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu.

Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlen säurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

2 – Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.

3 – Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

4 – Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.
- Keinen Zucker hinzufügen
- Nicht geeignet zur Sondenernährung.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Weitere Hinweise

Muttermilch ist die beste Ernährung für ihr Baby!

Novalac V ist von Geburt an zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen geeignet, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Ab dem 6. Monat sollte Novalac V in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden.

Novalac V nicht anwenden bei Kuhmilchproteinallergie, Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem. Die Proteinquelle in Novalac V ist Kuhmilch. Das Produkt ist nicht für die parenterale Ernährung sowie zur Sondenernährung geeignet. Bitte wenden Sie Novalac V nur unter ärztlicher Kontrolle an. Novalac V ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zum Diätmanagement von Verstopfung.

Kontakt

Vived GmbH

Horbeller Straße 11
50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240

Fax: 0049-(0)2234-2036-44

Email: dieter.marx@vived.de