

# WOBE-MUCOS TABLETTEN

120 Tabletten: PZN 11181068

## Eigenschaften

Die bilanzierte Diät Wobe-Mucos® ist bestimmt zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie.

- Als ergänzende Maßnahme zur Primärtherapie mit positivem Effekt auf den Krankheitsverlauf
- Wobe-Mucos kann hier unterstützen und die Nebenwirkungen der primären Krebstherapie abschwächen und reduzieren

## Nährwerte & Zutaten

Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Nährstoffe	Pro 100 g	Pro 6 Tabl.	Pro 12 Tabl.
Brennwert (kJ/ kcal)	1028 / 251	31 / 8	62 / 16
Fett,	1,9 g	0,06 g	0,12 g
davon gesättigte Fettsäuren	1,4 g	0,04 g	0,08 g
Kohlenhydrate,	< 0,2 g	< 0,01 g	< 0,02 g
davon Zucker	< 0,2 g	< 0,01 g	< 0,02 g
Eiweiß	24 g	0,7 g	1,4 g
Salz	0,36 g	0,01 g	0,02 g
(davon Natrium)	(142 mg)	(4 mg)	(8 mg)
Papain (Papaya)*	10 g	324 mg	648 mg
Trypsin (Rind, Schwein)*	11 g	348 mg	696 mg
Chymotrypsin (Rind)*	5,7 g	180 mg	360 mg

Mind. 1500 F.I.P.-Einheiten pro Tablette  
\* bezogen auf Papain 5 F.I.P.-E./mg,  
Trypsin 30 F.I.P.-E./mg,  
Chymotrypsin 400 F.I.P.-E./mg

Zutaten: Füllstoff Cellulose; Papain (enthält Sulfite); Trypsin, Chymotrypsin; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Cocosöl; Überzugsmittel Natriumalginat, Ethylcellulose und Fettsäuren. Frei von Gluten, Zucker, Farbstoff und Lactose.

## Anwendung

Die richtige Einnahme von Wobe-Mucos ermöglicht die optimale Wirkung.

Während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie kann die Einnahme von Wobe-Mucos dabei helfen, deren spezifischen Nebenwirkungen abzuschwächen. Sprechen Sie Ihren Arzt auch von sich aus auf die Möglichkeit der Behandlung mit Wobe-Mucos an, wenn Sie die Enzymbehandlung als sinnvoll erachten.

- Begleitend zu einer Chemo- und/oder Strahlentherapie nehmen Sie täglich 3 x 4 Tabletten Wobe-Mucos ein.
- Nach der Chemo- und/oder Strahlentherapie können Sie die Dosis auf täglich 3 x 2 Tabletten Wobe-Mucos reduzieren.

Die Tabletten werden immer unzerkaut und mit reichlich Flüssigkeit (Wasser) eingenommen. Die Tabletten sollten für eine optimale Wirkung mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Erfahrungsgemäß ist auch eine Einnahme von 2 x 6 Tabletten während oder 2 x 3 Tabletten nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie möglich.

## Weitere Hinweise

Dieses Produkt enthält Stoffe aus der Papaya.

Gleichzeitige Anwendung von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen (Antikoagulantien und/oder Thrombozytenaggregationshemmer), darf nur nach sorgfältigem Abwägen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nicht über 25 °C aufbewahren.  
Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

## Kontakt

MUCOS Pharma GmbH & Co. KG

Pharma GmbH  
13509 Berlin

Telefon: 089/63 83 72-400

Fax: 089/63 83 72-161

E-Mail: [info@mucos.de](mailto:info@mucos.de)