schülke



Einwirkzeit vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut: 2 Min.

Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum mit mindestens 24 Stunden Langzeitwirkung.

kodan® Tinktur forte farblos

Unser Plus

- Langzeitwirkung über mindestens 24 Stunden
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Sehr schneller Wirkungseintritt und sehr gute Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiet

- Zur präoperativen Hautantiseptik / postoperativen Nahtversorgung
- Vor Katheterisierungen, Injektionen, Blutentnahmen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien
- Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen
- Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden.*

*die VAH Listung umfasst nicht die hygienische Händedesinfektion.

Anwendungsgebiete	Einwirkzeit
Talgdrüsenarme Haut: Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion *(gemäß VAH)*	60 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Vor Gelenkpunktionen *(gemäß VAH)*	60 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Vor Injektionen und Blutentnahmen *(gemäß VAH)*	15 Sek.
Talgdrüsenreiche Haut *(gemäß VAH)*	2 Min.
Hygienische Händedesinfektion *(EN 13727; EN 1500)*	30 Sek.

Anwendungshinweise

Vor allen invasiven Eingriffen

- kodan® unverdünnt anwenden
- Betreffendes Hautareal besprühen oder mit einem getränkten Tupfer aufbringen, vollständige Benetzung der Haut sicherstellen und Einwirkzeiten beachten
- Überschüssiges Präparat aufnehmen, um eine Pfützenbildung zu vermeiden

Bei präoperativer Hautantiseptik

- Haare an der betroffenen Hautstelle mechanisch kürzen oder chemisch entfernen
- Grundsätzliche präoperative Waschungen (z.B. mit octenisan®) werden empfohlen
- Um das Verwischen von Hautmarkierungen zu vermeiden, ausschließlich Hautmarkierungsstifte mit einer ausreichenden Alkoholbeständigkeit verwenden (z.B. Devon™ Chirurgischer Mini-Markierungsstift (REF 31146020))

kodan® Tinktur forte farblos

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
MRSA	EN 13727	15 Sek.
bakterizid	EN 13727	15 Sek.
levurozid	EN 13624	15 Sek.
mykobakterizid	EN 14348	1 Min.
Viren		
Adenovirus (Typ 5)	EN 14476	10 Min.*
Herpes simplex-Virus	EN 14476	15 Sek.*
Rotavirus	EN 14476	30 Sek.
begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek.*

Angaben aller Konzentrationen unter hoher organischer Belastung
*geringe Belastung

Zertifikate / Normen

Wirksamkeit gegen Adenovirus: in Anlehnung an EN14476 (25°C)

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: 45 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0.2 g Biphenyl-2-ol

Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur), gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Dichte	ca. 0,90 g/cm³ / 20 °C
Flammpunkt	24 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
Geruch	nach Alkohol

Besondere Hinweise

Zur äußeren Anwendung auf intakter Haut. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur forte farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur forte farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. Entzündlich. Nicht in Kontakt mit Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Bei der Benutzung von Thermokautern oder anderen elektrischen Geräten auf eine ausreichende Abtrocknung achten.
Nach Anbruch des Arzneimittels nicht länger als 12 Monate, jedoch nicht über das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum hinaus anwenden.
Bei Verwendung vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut abtrocknen lassen, um eventuelle Beeinträchtigungen der Messergebnisse zu vermeiden.
Bei Verwendung von Inzisionsfolien vor dem Aufkleben der Folie auf eine ausreichende Abtrocknung achten, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
kodan® Tinktur forte farblos 1 l Flasche	10 / Karton(s)	4032651040070	6099519	104007
kodan® Tinktur forte farblos 250 ml Flasche	10 / Karton(s)	4032651040056	2335549	104005
kodan® Tinktur forte farblos 6 ml Flasche	40 / Karton(s)	4032651986347		70004010
kodan® Tinktur forte farblos Klinikpackung 1 l Flasche	10 / Karton(s)	4032651961023	11728437	70000899
kodan® Tinktur forte farblos Klinikpackung 250 ml Flasche	10 / Karton(s)	4032651040124	17938963	104012

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Wandhalterung Kunststoff 1l	134416

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

2921 / 910021-DE-de-DE-06.01 2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

kodan® Tinktur forte farblos

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.
Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

kodan® Tinktur forte farblos
Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 01/22
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

schülke
schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

2921 / 910021-DE-de-DE-06.01 2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.