



Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung

Oxymetazolinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss WICK Sinex avera Nasenspray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist WICK Sinex avera Nasenspray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von WICK Sinex avera Nasenspray beachten?
3. Wie ist WICK Sinex avera Nasenspray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK Sinex avera Nasenspray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST WICK SINEX AVERA NASENSPRAY UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

WICK Sinex avera ist ein Nasenspray zur lokalen Linderung der Symptome einer verstopften Nase in Verbindung mit einer Erkältung oder Sinusitis (Entzündung der Nasennebenhöhlen).

Die Wirkung des Sprays beginnt nach einigen Minuten und hält 6-8 Stunden an.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WICK SINEX AVERA NASENSPRAY BEACHTEN?

WICK Sinex avera Nasenspray darf nicht angewendet werden wenn Sie

- überempfindlich (allergisch) gegen Oxymetazolinhydrochlorid oder einen der sonstigen Bestandteile von WICK Sinex avera Nasenspray sind (s. Abschnitt 6)
- Monoaminoxidasehemmer einnehmen oder in den letzten zwei Wochen eingenommen haben (MAO-Hemmer werden zur Behandlung der Parkinsonschen Krankheit und Depression verwendet)
- an einer akuten Herzerkrankung oder Herzasthma leiden
- an erhöhtem Augendruck (Engwinkelglaukom) leiden
- sich einer Operation zur Entfernung Ihrer Hirnanhangsdrüse unterzogen haben
- an einer Entzündung der Haut oder der Schleimhäute Ihrer Nasenlöcher leiden oder Krusten in Ihrer Nase haben.

WICK Sinex avera Nasenspray darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von WICK Sinex avera Nasenspray ist erforderlich

- so dass Sie mit Ihrem Arzt sprechen sollten falls Sie an
- Bluthochdruck,
 - Herzerkrankung,
 - Diabetes,
 - Beeinträchtigung Ihrer Schilddrüsenfunktion leiden.

Bei Anwendung von WICK Sinex avera Nasenspray mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

- **Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer)** werden zur Behandlung der Parkinsonschen Krankheit und Depression verwendet – WICK Sinex avera Nasenspray **nicht anwenden**, wenn Sie MAO-Hemmer in den letzten zwei Wochen eingenommen haben.
- **Trizyklische Antidepressiva** - informieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen einnehmen, wie z.B. Amitriptylin und Imipramin.
- **Blutdrucksenkende Mittel** - informieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung, wenn Sie Bethanidin, Debrisoquin und Guanethidin einnehmen, da die Wirkung dieser Arzneimittel verringert werden kann.
- **Arzneimittel gegen Parkinsonsche Krankheit (Bromocriptin)** - die Behandlung mit WICK Sinex avera Nasenspray kann bei gleichzeitiger Anwendung beeinträchtigt sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von WICK Sinex avera Nasenspray Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Das Spray sollte während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur mit Vorsicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen beobachtet.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von WICK Sinex avera Nasenspray

Benzalkoniumchlorid (ein Konservierungsstoff) ist ein Bestandteil von WICK Sinex avera, der insbesondere bei Langzeitanwendung zum Anschwellen der Nasenschleimhäute führen kann.

3. WIE IST WICK SINEX AVERA NASENSPRAY ANZUWENDEN?

Wenden Sie WICK Sinex avera Nasenspray immer genau nach der Anweisung Ihres Apothekers oder Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung: Die empfohlene Dosis ist:

Erwachsene und Kinder über 10 Jahre: 1 - 2 Sprühstöße in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3 mal täglich.

Kinder von 6 - 10 Jahren: 1 Sprühstoß in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3 mal täglich.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren.

Die empfohlene Dosierung nicht überschreiten.

Nicht länger als 7 Tage ununterbrochen anwenden.

Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum kann WICK Sinex avera Nasenspray eine verstopfte Nase verursachen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn sich die Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen nicht bessern.

Art der Anwendung

1. Verschlusskappe abnehmen. Flasche aufrecht halten und den Sprühaufsatz in das Nasenloch halten. Das andere Nasenloch zuhalten.
2. Sprühen und gleichzeitig tief durch die Nase einatmen. Den Vorgang mit dem anderen Nasenloch wiederholen.
3. Erwachsene und Kinder über 10 Jahren können die Schritte 1 und 2 gegebenenfalls einmal wiederholen.
4. Den Sprühaufsatz mit einem sauberen, feuchten Papiertuch abwischen und die Verschlusskappe sofort nach der Anwendung wieder aufsetzen.

Wenn Sie eine größere Menge WICK Sinex avera Nasenspray angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zuviel WICK Sinex avera angewendet haben sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt kontaktieren oder ein Krankenhaus aufsuchen und die Flasche oder Verpackung mitnehmen.

Wenn Sie die Anwendung von WICK Sinex avera Nasenspray vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Dosis vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Anwendung laut Dosieranleitung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann WICK Sinex avera Nasenspray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- **Gelegentlich** (bei weniger als 1 von 100 Personen): Niesen, Trockenheit oder Reizung in Nase, Mund oder Rachen.
- **Selten** (bei weniger als 1 von 1000 Personen): Beklemmung, Müdigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen bei Kindern, Herzjagen, Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, verstopfte Nase, Schwellung der Nasenschleimhaut, Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautrötung, Hautausschlag und Sehstörungen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST WICK SINEX AVERA NASENSPRAY AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was WICK Sinex avera Nasenspray enthält
Der Wirkstoff ist 0,5 mg/ml Oxymetazolinhydrochlorid

Die sonstigen Bestandteile sind: Sorbitol, Natriumcitrat-Dihydrat, Tyloxapol, Chlorhexidindigluconat-Lösung, wasserfreie Citronensäure, Aloetrockenextrakt, Benzalkoniumchlorid-Lösung, Acesulfam-Kalium, Levomenthol, Cineol, Natriumedetat-Dihydrat, L-Carvon, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser (Benzalkoniumchlorid siehe Ende von Abschnitt 2).

Wie WICK Sinex avera Nasenspray aussieht und Inhalt der Packung

WICK Sinex avera ist ein Nasenspray mit Dosierpumpe. Die Packung enthält eine Braunglasflasche mit einem weißen Pumpaufsatz. Die Flasche enthält 15 ml Lösung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma
Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
D-65823 Schwalbach
Tel: 0800-9425847

Hersteller
Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Sulzbacher Straße 40-50
D-65824 Schwalbach am Taunus

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Schweden: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nasspray, lösning;
Österreich: WICK SinexAloe Nasenspray; **Belgien:** Vicks SinexAloe; **Holland:** Vicks Sinex Aloe; **Portugal:** Sinexsensi; **Spanien:** Sinexsensi; **Vereinigtes Königreich:** Vicks Sinex Soother

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2008.