



Gebrauchsanweisung

Pascosan® Reizdarm IBS-3

Zur Behandlung des Reizdarmsyndroms (IBS)
30 Tabletten · Medizinprodukt

zur Behandlung des Reizdarmsyndroms (IBS) mit Symptomen wie

- Bauchschmerzen
- Verstopfung
- Durchfall
- Blähbauch und Blähungen

Pascosan® Reizdarm IBS-3 ist ein Medizinprodukt zur Behandlung des Reizdarmsyndroms, gekennzeichnet durch Schmerzen, Blähbauch, Bauchschmerzen, Völlegefühl und Bauchbeschwerden, mit oder ohne Effekte auf Aussehen und Beschaffenheit des Stuhlgangs und gestörter Verdauung (Verstopfung, Durchfall oder Wechsel von beidem).

Dank seiner mechanischen Schutzwirkung interagiert **Pascosan® Reizdarm IBS-3** physikalisch mit der Darmschleimhaut und bildet einen mukoadhäsiven (anhaftenden) Film, der die Schleimhaut vor dem Kontakt mit Reizstoffen schützt.

Gleichzeitig trägt es zur Ausscheidung von Schadstoffen bei, indem es deren Aufnahme (Resorption) entgegenwirkt.

Pascosan® Reizdarm IBS-3 hilft durch einen physikalischen Mechanismus, Darmgase zu binden, Toxine auszuschleiden und so die typischen Beschwerden des Reizdarmsyndroms zu reduzieren.

Das Medizinprodukt trägt dazu bei, die Barriere des Darmepithels intakt zu halten und das Gleichgewicht des Darms aufrechtzuerhalten.

Inhaltsstoffe: Polysaccharide aus Goji-Beeren (*Lycium barbarum* L.) und Aloe vera (*Aloe vera* (L.) Burm. F.), mikronisierter Zeolith (Klinoptilolith), *Lactobacillus plantarum* HA119 inaktiviert (enthält Soja, Milch und Milch-Derivate, einschließlich Laktose), ätherisches Pfefferminzöl, mikrokristalline Cellulose, Dicalciumphosphat, pflanzliches Magnesiumstearat, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Siliciumdioxid.

Glutenfrei.

Anwendung: Zweimal täglich 1 Tablette mit Abstand vor oder nach den Mahlzeiten oder nach Anweisung des Arztes oder Apothekers einnehmen.

Bei akuten Schmerzen kann die Dosierung verdoppelt werden.

Je nach Intensität der Beschwerden wird empfohlen, die Behandlung 2 bis 6 Wochen fortzusetzen und bei Wiederauftreten der ersten Symptome zu wiederholen.

Warnhinweise:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, wird empfohlen, das Produkt nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit oder bei Kindern unter 12 Jahren anzuwenden bzw. vorher ärztlichen Rat einzuholen.
- Nehmen Sie nicht mehr als die Dosis von 4 Tabletten pro Tag ein.
- Nicht einnehmen, wenn Sie allergisch oder überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Das Verfalldatum bezieht sich auf das unversehrte und ordnungsgemäß gelagerte verpackte Produkt.

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur, an einem kühlen und trockenen Ort in der gut verschlossenen Originalverpackung.

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:							
							
Charge	Verwendbar bis	Gebrauchs- anweisung beachten!	Medizinprodukt	Referenznummer	Nicht verwenden wenn Packung beschädigt ist	Hersteller	Vertrieb



Labomar S.p.A.
Via N. Sauro 35/I
IT-31036 Istrana (TV)



Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
DE-35394 Gießen



0477



FTP91



Stand der Information: 2025-07