

# NOVALAC BK SÄUGLINGSSPEZIALNAHRUNG

800 g Pulver: PZN 06488468

## Anwendung

Novalac BK ist eine Spezialnahrung von Geburt an geeignet zum Diätmanagement bei Blähungen und Koliken, wenn nicht oder teilweise gestillt wird.

Novalac BK hilft auf natürliche Weise – durch einen reduzierten Lactosegehalt – wenn ein Säugling zu Darmgasen (Blähungen und Koliken) neigt.

- Zum Diätmanagement von Blähungen und Koliken
- Von Geburt an bis zu 36. Monaten
- Reduzierter Lactosegehalt (Milchzuckergehalt)
- Sanfte Zusammensetzung
- Alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort
- Inhalt: 800g

## Nährwerte & Zutaten

**Magermilch**, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Galacto-Oligosaccharide (aus **Milch**), Lactose (aus **Milch**), **Fischöl** (mit **Milch**), Calciumsalze der Zitronensäure, Cholinbitartrat, Emulgator (**Sojalecithin**), Natriumchlorid, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothersäure, Inositol, Eisendiphosphat, L-Cystin, L-Tryptophan, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, natürliche Milchsäurekultur (*Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus rhamnosus*), Öl aus *Mortierella alpina* (mit **Milch**), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Taurin, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, L-Carnitin, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat, Kaliumcitrat, Natriumcitrat.

**NAHRWERTE**

	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
<b>Energie</b>	kJ	2103	273
	kcal	502	65
<b>Fett</b>	g	25	3,3
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	11,7	1,5
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,1	0,7
<b>Kohlenhydrate</b>	g	58,1	7,6
davon			
- Zucker	g	18,6	2,4
davon			
- Lactose	g	18	2,3
GOS (Galacto-Oligosaccharide)	g	1,85	0,2
<b>Ballaststoffe</b>	g	1,2	0,2
<b>Eiweiß</b>	g	10,4	1,4
<b>Salz</b>	g	0,475	0,06
<b>Vitamine</b>			
Vitamin A	µg	440	57
Vitamin D	µg	11,5	1,5
Vitamin K	µg	60	7,8
Vitamin C	mg	60	7,8
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,5	0,07
Niacin	mg	4,5	0,6
Folat	µg-DFE	150	20
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	1,5	0,2
Pantothensäure	mg	5	0,7
Biotin	µg	18	2,3
Vitamin E	mg	8,7	1,1
<b>Mineralstoffe</b>			
Natrium	mg	190	25
Chlorid	mg	400	52
Kalium	mg	590	77
Calcium	mg	500	65
Phosphor	mg	335	44
Magnesium	mg	40	5,2
Eisen	mg	5	0,7
Zink	mg	3,5	0,5
Kupfer	mg	0,38	0,05
Jod	µg	95	12
Selen	µg	26	3,4
Mangan	mg	0,035	0,005
Chrom	µg	<45	<5,9
Molybdän	µg	<45	<5,9
Fluorid	mg	<0,45	<0,06
<b>Weitere Inhaltsstoffe</b>			
Cholin	mg	170	22
Inositol	mg	80	10,4
Taurin	mg	40	5,2
L-Carnitin	mg	20	2,6

# Dosierung

DOSIERUNG						
Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Anzahl Flaschen pro Tag	6	5	5	4	3 <sup>**</sup>	2 <sup>**</sup>
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7	7	8
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210	210	240

## Zubereitung

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

- 1 – Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlen säurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
- 2 – Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
- 3 – Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
- 4 – Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.
- Keinen Zucker hinzufügen
- Nicht geeignet zur Sondenernährung.

- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.
- Novalac BK nicht bei Galactosämie geben.

## Weitere Hinweise

Muttermilch ist die beste Ernährung für ihr Baby!

Novalac BK ist von Geburt an zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen geeignet, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Ab dem 6. Monat sollte Novalac BK in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden.

Novalac BK nicht anwenden bei Kuhmilchproteinallergie, Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem. Die Proteinquelle in Novalac BK ist Kuhmilch. Das Produkt ist nicht für die parenterale Ernährung sowie zur Sondenernährung geeignet. Bitte wenden Sie Novalac BK nur unter medizinischer Kontrolle an.

## Kontakt

### **Vived GmbH**

Horbeller Straße 11

50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240

Fax: 0049-(0)2234-2036-44

Email: [dieter.marx@vived.de](mailto:dieter.marx@vived.de)